

糖尿病の方でも問題なく お受けいただけます


- ・検査前6時間の食止めをお願いします。
- ・この間の糖尿病治療薬はお控え下さい。

膵癌

FBS **233**mg/dl

肺癌

FBS **288**mg/dl



通常より全体的な集積は低くなりますが、
原発巣・転移巣の評価は可能です

- ・腎不全の方にも安全に行えます。
- ・妊娠中の方はお受けいただけません。
- ・妊娠の可能性のある方、授乳中の方には
注意が必要です(ご相談下さい)。
- ・同日のMRI検査との組み合わせにも
対応致します(お問い合わせ下さい)。

お申し込み方法

2分程度で完了します

01 まずお電話ください
TEL 055-278-5500

〈対応時間〉月～金曜日
9時～17時(年末年始を除く)

02 患者さんのプロフィールを
お知らせください

03 検査日時を決定します

04 紹介状をFAXしてください
FAX 055-278-5501

・メール添付用テンプレートあり
(お問い合わせ下さい)

✉ info@ypic.jp

・参考画像の提供をお願いします

クリニックより患者さんへ
検査案内書(問診票、同意書)を発送します。

 **山梨PET画像診断クリニック**

〒409-3821
山梨県中央市下河東3046-2
TEL 055-278-5500
FAX 055-278-5501

 ypic.jp **山梨PET**



PET検査のご案内

消化器科専門の 先生方へ

消化
器科


患者さんのために
役立つことが
PET検査にあります。



消化器腫瘍（食道・胃・大腸・肝胆膵など）の 病期診断・治療後再発診断にご活用下さい。




低分化HCC




高分化ではFDG低集積となるHCCも
分化度が低いと高集積となる。

HCC治療後腫瘍マーカー上昇




溶骨性転移を
明瞭に描出。

直腸癌術後 CTで骨盤内 リンパ節再発を指摘



CTで指摘された
リンパ節転移（→）以外に、
腹膜播種（○）を指摘。

直腸癌術後 腫瘍マーカー上昇



CTではっきりしない
仙骨浸潤（→）を
明瞭に描出。

**同日造影MRI+全身PET/CT
（骨盤部・肝など）
もお受けします。**



悪性腫瘍に対する
FDG PET保険適応

早期胃がんを除く、すべての悪性腫瘍、悪性リンパ腫

（他の画像診断により病期診断、
転移、再発診断ができない時）